

**【薬品構成】**

有効成分: クエン酸シルデナフィル 100mg  
 服用量: 医師の指示に従ってください。(通常1回1錠)  
 保管: 室温30°C以下の場所で保存してください。

**【効能】**

Paladigraは男性の勃起不全を治療するための薬剤です。この製品は男性の性的機能不全の治療のために使用されるクエン酸シルデナフィルを含有するバイアグラのジェネリック薬品になります。Paladigraの主な効能はペニスへの血液通過の量を増加させるものであります。

**【投与量と効果有効時間】**

Paladigraは行為の約45分前に1錠服用し、4~6時間ほどの効果が期待できます。

**【注意事項】**

- ・アレルギー、貧血、眼疾患、癌、高血圧や低血圧、不整脈、心不全、胸の痛み、特定の疾患などの持病をお持ちの場合は、かかりつけの医師に相談してください。
- ・副作用を悪化させる可能性があるため、薬が効いている状態で急に起き上がったり、立ち上がったりしないでください。
- ・アルコールを飲むことは効果が半減するため控えてください。
- ・すでに別のED薬を使用した場合、Paladigraの服用はしないでください。
- ・アルプロスタジル (Caverject, ミューズ, EDEX) またはヨヒンビン (Yocon, Yodoxin, 他) をPaladigraと併用する場合は使用前に医師に相談することをお勧めいたします。

**【Paladigraの併用禁忌薬】**

Paladigraはニトログリセリンとの併用が禁忌とされています。バイアグラとニトログリセリンは、どちらも血管を拡張させる作用があることから、血圧の低下をもたらします。血圧が低下しすぎると、最悪生命に危険を引き起こすことにもなります。また18歳以下の方は、この薬を服用しないでください。

**【副作用の可能性】**

一部の服用者の中には副作用として、頭痛、下痢、めまい、胃のむかつき、嘔吐、鼻づまりが発生することがあります。またパラディグラは、持続勃起または長時間の勃起状態が続くことが稀にあります。深刻な状態になることがありますので、勃起状態が長時間継続した場合には一度医師にご相談ください。

**【薬物相互作用】**

Paladigraは、有機硝酸塩が含まれている薬物療法で治療している患者に対しての処方は医師からされてはおりません。Paladigraの血中濃度は、エリスロマイシン、ケトコナゾール、イトラコナゾールおよびサキナビルなどの影響により上昇いたします。これらの薬はPaladigraとの相互作用があることが知られています。

**【過剰摂取】**

Paladigraを過剰摂取した場合、失神、胸痛、吐き気、不規則な心拍、立ちくらみが発生することがあります。その場合は使用を止め、直ちに医師の診断を受けてください。

**【保管方法】**

湿気、日光をさけ、子供やペットの届かないところに置き、常温で保管してください。

**【Composition】**

Tablet contains: Sildenafil Citrate IP 100mg.

Dosage: As directed by the Physician.

Storage: Store at a temperature below 30°C.

**【Efficacy】**

This Paladigra is a medication used to treat erectile dysfunction. This product is a generic drug of Viagra containing sildenafil citrate for the treatment of male sexual dysfunction. The main efficacy of Paladigra increases amount of blood passing to the penis.

**【Common use】**

100mg Paladigra dose effects in 45 minutes and last during 4~6 hours.

**【Precautions】**

- ・Before to take Paladigra notify your doctor if you suffer from allergies, anemia, eye diseases, cancer, high blood pressure or low blood pressure, irregular heart rhythm, heart failure, unstable chest pain, certain eye disorders, deformation of the penis or have history of such conditions or take protease inhibitors for the treatment of HIV.
- ・Do not stand up fast from a lying or sitting position.
- ・Avoid drinking alcohol as it may worsen side effects.
- ・Do not take Paladigra if you have already taken another ED medication.
- ・Warn your doctor before to take Paladigra if you use alprostadil (Caverject, Muse, Edex) or yohimbine (Yocon, Yodoxin, others).

**【Contraindications】**

Paladigra is contraindicated in patients with allergy to the medication or those who are treated with nitrates (such as nitroglycerin). This combination can result in very low blood pressure that can lead to a stroke, a heart attack, or death. Do not take this medication if you are under 18 y.o.

**【Possible side effects】**

Some patients may experience headache, diarrhea, dizziness, upset stomach, vomiting, nasal congestion.

Paladigra can cause a rare but serious condition of prolonged erection (priapism).

Necessary to contact your health care provider at once if your erection lasts for a long time.

**【Drug interactions】**

Paladigra should not be prescribed to patients treated with medications which contain organic nitrates.

Paladigra blood levels are raised by erythromycin, ketoconazole, itraconazole and saquinavir.

These medications are known to interact with Paladigra.

**【Overdose】**

If you overdosed Paladigra you may experience fainting, chest pain, nausea, irregular heartbeat, lightheadedness. Seek for immediate medical help if so.

**【Storage】**

Store at room temperature away from moisture, sunlight, kids and pets in a tight container.