

**【药物成分】**

主要有效成分：枸橼酸西地那非 100 mg

服用量：请根据医生指示服用。(1 次 1 片)

保存方法：请保存于室温 30°C 以下的地方。

【功效】

Paladigra 用于治疗男性勃起功能障碍 (ED)，本品为含 100 mg 枸橼酸西地那非的万艾可仿制药。Paladigra 主要功效为提升通过阴茎的血流量。

【用量与产生效果时间】

Paladigra 在发生性行为前 45 分钟服用 1 粒即可，效果一般可持续 4~6 小时。

【注意事项】

- 患有过敏、贫血、眼部疾病、癌症、高血压及低血压、心律不齐、心力衰竭、胸口疼痛、特殊疾病的人群，请在医生指导下服用。
- 为避免副作用加深，在药效发挥时请勿突然起身或起立。
- 饮酒前后服用会减轻药效，请注意。
- 18 岁以下未成年人请勿服用本品。
- 如已经服用了其他治疗男性勃起功能障碍的药物，请勿同时服用 Paladigra。
- 如同时使用前列地尔 (Caverject、MUSE、EDEX) 或育亨宾 (Yocon、Yodoxin、其他)，请在服用 Paladigra 前咨询医生。

【禁止与 Paladigra 同时服用的药物】

Paladigra 切勿与硝酸甘油同时服用。

Paladigra 与硝酸甘油都具有扩张血管的作用，同时服用会引起血压急剧下降。若血压过低，可能会导致生命危险。

【可能引起的副作用】

部分服用本品的患者可能会出现头痛、腹泻、头晕、胃部不适、呕吐、鼻塞的不良反应。少量患者会出现持续勃起或勃起时间延长。为避免造成严重后果，若过长时间处于勃起状态，请及时就医。

【药物相互作用】

对服用含有机硝酸酯类药物接受治疗的患者，医生不会开具 Paladigra。Paladigra 的血药浓度会受红霉素、酮康唑、伊曲康唑、沙奎那韦等药物的影响而上升。上述药物与 Paladigra 有相互作用。

【过量服用】

如过量服用 Paladigra，会引发昏厥、胸痛、想吐、心跳不齐、体位性低血压症状。如出现上述症状，请停止服用并及时就医。

【保存方法】

请放于干燥处，避免阳光直射，在常温下保存。请勿放在儿童或宠物容易接触到的地方。

【약품구성】

유효성분: 구연산 실태나필 100mg

복용량: 의사의 진단에 따라 복용하시기 바랍니다.(통상 1회 1정)

보관: 실온 30°C 이하에서 보관하시기 바랍니다.

【효과】

Paladigra는 남성발기부전을 치료하기 위한 의약품입니다. 이 약품은 만성의 성적 기능부전의 치료로 사용하고 있는 구연산 실태나필을 함유한 비아그라의 제네리ك의약품입니다. Paladigra의 주요효과는 성기의 혈액량을 증가시켜줍니다.

【복용량과 효과지속시간】

Paladigra는 성행위 약 45분전에 1정을 복용하시면 4~6시간정도 효과가 지속됩니다.

【주의 사항】

- 알레르기, 빈혈, 안구질환, 암, 고혈압과 저혈압, 부정맥, 심부전, 가슴 통증, 특정 질환등의 지병으로 치료를 받고 계시는 분은 반드시 의사와 상담하시기 바랍니다.
- 부작용이 악화될 가능성이 있으므로 약효과가 나타날때 갑자기 일어나서나 하는 행위는 삼가하시기 바랍니다.
- 음주를 하신후에 복용하시면 효과가 감소되므로 주의하시기 바랍니다.
- 현재 다른 ED치료제를 복용하시고 계시면 Paladigra의 복용을 삼가하시기 바랍니다.
- 알프로스타딜 (제품명 = Caverject,Muse,EDEX) 또는 요힘빈(제품명 Yocon, Yodoxin)을 Paladigra와 같이 복용할 경우에는 사용전에 반드시 의사와 상담하시기 바랍니다.

【Paladigra의 병용금지 성분】

Paladigra는 나이트로글리세린과 병용하는 것을 금지시하고 있습니다. 비아그라와 나이트로글리세린은 둘다 혈관을 확장시키는 역할을 가지고 있어서 병용시에는 혈압이 떨어질수 있습니다. 혈압이 갑자기 저하되면 인체 생명에 영향을 줄수 있습니다. 이 약품은 18세이하의 사용을 금지합니다.

【부작용의 가능성】

일부 복용자중에는 부작용으로 두통, 설사, 현기증, 위장장애, 구토, 코 막힘이 발생할 수 있습니다. 또한 파라디그라는 발기 또는 장시간의 발기 상태가 지속될 수 있는 경우가 있습니다. 심각한 상태가 될 수 있으므로 발기 상태가 장시간 이상 지속될 경우에는 일단 의사와 상담하십시오.

【약물상호작용】

Paladigra는 유기질산염이 함유되어 있는 약물치료를 받고 있는 환자에게는 의사가 처방을 하지 않고 있습니다. Paladigra의 혈중농도는 에리트로마이신, 케토코나졸, 이트라코나졸, 사카나비르등의 영향으로 상승합니다. 이는 이 약물을 Paladigra와의 상호작용이 있다고 알려져 있습니다.

【과다복용】

Paladigra를 과다복용시에는 실신, 가슴통증, 구토, 불규칙한 심박수, 어지러움이 발생할 수 있습니다. 이 경우에는 사용을 멈추시고 의사의 진찰을 받으십시오. 반드시 1일복용량을 준수하시기 바랍니다.

【보관방법】

습기, 햇볕을 피하시고 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.