



【化学成分】

活性成分：Minoxidil 5 mg

剂 量：按照医嘱。（一天一次，一次一片）

储 存：请在室温 30℃ 以下储存。

【功效】

Minoxidil 是用于治疗男性 AGA（男性型秃发）的口服药。

该产品为含有 5mg Minoxidil 的仿制药。

主要功效是抑制男性脱发。

【剂量】

每天一次，每次一片。

连续服用 3 个月左右，脱发会逐渐改善。

※通常需要连续服用 6 个月以上。

【注意事项】

- 对斑秃、皮肤病以及抗癌治疗药造成的脱发没有效果。
- 服用后，如脱发加剧请停止服用。
- 未满 20 岁请勿服用。
- 每天按时服用。
- 刚开始服用时可能会有脱发现象发生。

【服用 Minoxidil 时献血】

服用 Minoxidil 时请避免献血。

【可能引起的副作用】

- 低血压
- 心律失常
- 多毛症
- 性欲减退

※当身体出现异常时，请停止用药并及时就医。

【药物相互作用】

同时服用抗高血压药物，会有血压过低的危险。

【过量服用】

即使一天服用两片，效果也不会有变化。

※会有血压过低的危险。

【保存方法】

请放于干燥处，避免阳光直射，在常温下保存。

请勿放在儿童或宠物容易接触到的地方。

远离潮湿，阳光，不能接触到儿童和宠物，请保持室温。

【약품구성】

유효 주성분：미녹시딜5mg

복 용 량：의사의 지시를 따르십시오. (1일 1회 1정)

보 관：실온 30 ℃ 이하의 장소에 보관하십시오.

【효과】

미녹시딜은 남성 AGA（남성형 탈모증）을 치료하기 위한 경구 치료제입니다.

이 제품은 미녹시딜5mg을 함유한 의약품입니다.

미녹시딜의 주요 효능은 남성의 탈모를 억제하고 발모를 촉진시킵니다.

【복 용 량】

미녹시딜은 1일 1회 1정을 매일 복용하십시오.

복용 후 3개월부터 서서히 탈모가 개선됩니다.

※일반적으로 6 개월이상으로 지속적인 복용이 필요합니다.

【주의 사항】

- 원형 탈모증이나 피부 질환으로 탈모 또는 항암제 치료로 인한 탈모에는 효과가 없습니다.
- 복용을 중지하시면 다시 탈모가 진행합니다.
- 20세 미만의 미성년자는 미녹시딜을 복용하지 마십시오.
- 매일 일정한 시간에 복용한다.
- 복용초기에 탈모가 일어날 수 있습니다.

【미녹시딜 복용중의 현혈】

미녹시딜을 복용하는 분의 경우는 현혈을 피하십시오.

【부작용의 가능성】

- 저혈압
- 부정맥, 심장의 고동
- 다모증
- 성욕 감퇴

※신체에 이상이 있으실 경우에는 복용을 중지하고 의료 기관에 상담한다.

【약 물 상호작용】

강압제를 복용하시는 분은 과도한 혈압 저하 위험이 있습니다.

【과다복용】

1일 2정 이상을 복용해도 효과는 변동이 없습니다.

※복용을 잊으신 경우에는 다음날 정상적으로 1정 복용하십시오.

【보관방법】

습기, 직사광선을 피하고 어린이와 애완동물이 닿지 않는 곳에 두고 상온에서 보관하십시오.