

**【薬品構成】**

有効成分:バルデナフィル20mg
服用量:医師の指示に従ってください。(通常1回1錠)
保管:室温30℃以下の場所で保存してください。

【効能】

バリフは男性のED(勃起不全)を治療するための経口治療薬です。この製品はバルデナフィル 20mg を含有するレビトラのジェネリック薬品になります。バリフの主な効能はペニスへの血液量を増加させるものです。

【投与量と効果有効時間】

バリフは行為の約60分前に1錠服用し、約6~8時間程度の効果が期待できます。

【注意事項】

- アレルギー、貧血、眼疾患、癌、高血圧や低血圧、不整脈、心不全、胸の痛み、特定の疾患などの持病をお持ちの場合は、かかりつけの医師に相談してください。
- 副作用を悪化させる可能性があるため、薬が効いている状態で急に起き上がったり、立ち上がったりしないでください。
- 服用時、食事・飲酒の影響は受けにくいですが過剰な飲食・アルコール摂取は効果が半減するため控えてください。
- 18歳以下の方は、バリフを服用しないでください
- すでに別のED治療薬を服用している場合、バリフの同時服用はしないでください。
- アルプロスタジル (Caverject、ミュージズ、EDEX) またはヨヒンビン (Yocon、Yodoxin、他) をバリフと併用する場合は使用前に医師に相談することをお勧めいたします。

【バリフの併用禁忌薬】

バリフはニトログリセリンとの併用が禁忌とされています。理由はバリフとニトログリセリンには、どちらも血管を拡張させる作用があることから、急激な血圧の低下をもたらします。さらに血圧が低下しすぎると、最悪生命の危険を引き起こすことにもなります。

【副作用の可能性】

一部の服用者の中には副作用として、頭痛、下痢、めまい、胃のむかつき、嘔吐、鼻づまりが発生することがあります。またバリフは、持続勃起症または長時間の勃起状態が続くことが稀にあります。深刻な状態になることがありますので勃起状態が長時間継続した場合には一度医師にご相談ください。

【薬物相互作用】

バリフは、有機硝酸塩が含まれている薬物療法で治療している患者に対しての処方では医師からされてはおりません。バリフの血中濃度は、エリスロマイシン、ケトコナゾール、イトラコナゾールおよびサキナビルなどの影響により上昇いたします。これらの薬はバリフとの相互作用があることが知られています。

【過剰摂取】

バリフを過剰摂取した場合、失神、胸痛、吐き気、不規則な心拍、立ちくらみが発生することがあります。その場合は使用を止め、直ちに医師の診断を受けてください。

【保管方法】

湿気、日光を避け、子供やペットの届かないところに置き、常温で保管してください。

【Drug Facts】

Active Ingredient: Vardenafil 20mg per tablet
Usual Dosage: As directed by the Physician. (Take 1 tablet by mouth)
Storage: Store At below 30°C

【Efficacy】

VALIF is an oral therapeutic agent for treating male ED (erectile dysfunction). This product is a generic drug of Levitra containing 20 mg of vardenafil. The main efficacy of VALIF is to increase blood volume to penis.

【Common use】

Please take 1 tablet about 60 minutes before the act and can be expected an effect of about 6 to 8 hours.

【Precautions】

- Please consult your family doctor, If you have a medical condition such as allergy, anemia, eye disease, cancer, hypertension or hypotension, arrhythmia, heart failure, chest pain, certain diseases etc,
- Since there is a possibility of worsening side effects, please do not get up or rise suddenly with when medication is working.
- It is hard to be affected by meals and drinking. but excessive eating and drinking and alcohol an effect will be reduced to half, please refrain.
- If you are under 18 years old, please do not take VALIF.
- Do not take VALIF at the same time if you are already taking another ED medication.
- When using Alprostadil (Caverject, Muse, EDEX) or Yohimbin (Yocon, Yodoxin, etc.) in conjunction with VALIF, we recommend that you consult your doctor before use.

【Contraindications】

VALIF is contraindicated for use with nitroglycerin. Because the action makes a blood vessel expand both is well founded in VALIF and nitroglycerin, a decline of the sudden blood pressure will be brought. Furthermore, if blood pressure falls too much, Worst scenario is high risk of your life.

【Possible side effects】

Among some of the recipients, As side effects, headache, diarrhea, dizziness, upset stomach, vomiting, stuffy nose may occur. In addition, it is rare case but VALIF persistent erectile disease or long-term erectile condition persists. Sometime, it may become a serious condition please consult your doctor once if the erection state lasts for a long time.

【Drug interactions】

VALIF contains organic nitrate It is not prescribed by a doctor for patients treated with medication therapy. Blood concentrations of camphor gold are increased by the effects of erythromycin, ketoconazole, itraconazole and saquinavir. These medicines are well-known to interact with VALIF.

【Overdose】

Syncope, chest pain, nausea, irregular heartbeat, dizziness may occur when you overdose VALIF. In that case, stop using and get medical attention immediately.

【Storage】

Please avoid moisture and sunlight, Keep out of the reach of children and pets, Keep in room temperature.